

# HIPOFRACCIONAMIENTO MODERADO DE MAMA EN PACIENTES MAYORES. NUESTRA EXPERIENCIA.

**Autores:** Cristina Prieto Prieto, Verónica Hernández Uribe, Vanessa Jerviz Guía, José Carlos Villén Villén, Antonio Lazo Prados, Verónica Chacón Mcweeny, Paula Blasco Valls, Isabel María Fernández Quiles, Isabel Castillo Pérez.  
*Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio –Campus de la Salud. Granada.*

**Introducción:** El esquema de hipofraccionamiento moderado es una forma de mejorar la accesibilidad de la radioterapia adyuvante de cáncer de mama a pacientes de edad avanzada, con comorbilidades y problemas de movilización o desplazamiento.

**Objetivo:** evaluar la efectividad y tolerancia al tratamiento de los pacientes en nuestro servicio.

## Material y Métodos:

N= 17 (Marzo 2017- Agosto 2018)

Edad media: 78.7 (69-86) años

Se evaluó la toxicidad del tratamiento de acuerdo a la escala CTCAEV4.0.

### Clasificación por Estadios



### Tratamiento Quirúrgico previo



### Esquemas de Hipofraccionamiento utilizados:

SEMANAL: 27,5 -34,2Gy a 5,5-6,5Gy/fracción, 1 sesión por semana.

FAST-FORWARD: 26Gy a 5,2 Gy/fracción, 1 sesión al día, 1 semana.


**Resultados:** Media de Seguimiento 4,05 (0-10) meses

SUPERVIVENCIA GLOBAL


S. LIBRE DE ENFERMEDAD

100%

100%



**Conclusión:** Ambos esquemas tuvieron un excelente cumplimiento terapéutico y una tolerancia adecuada. El escaso periodo de seguimiento hace que no podamos extraer conclusiones en cuanto a la efectividad en el control local de estos esquemas.



Sevilla 2018 · 15 y 16 de Noviembre · Hotel Sevilla Center

